# Info'Prairie Ardèche – 20/03/2023

Contact : Emmanuel FOREL (emmanuel.forel@ardeche.chambagri.fr/06 85 10 09 96)

Somme de températures en °C depuis le 1er février au : 20/03/23

| Bas-Vivarais | | Pentes (Cévennes, Coiron, Boutières) | | Haut-Vivarais | | Montagne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 412 | 400 m | 363 | 400 m | 344 | 900 m | 220 |
| 200 m | 383 | 500 m | 334 | 500 m | 314 | 1000 m | 196 |
| 300 m | 353 | 600 m | 304 | 600 m | 285 | 1100 m | 174 |
| 400 m | 323 | 700 m | 275 | 700 m | 257 | 1200 m | 153 |
| 500 m | 294 | 800 m | 246 | 800 m | 231 | 1300 m | 135 |

Gestion de l'herbe : les stades repères en somme de températures

| Type de prairie | Mise à l'herbe | Fin déprimage |
|---|---|---|
| Prairie naturelle fertile et précoce, prairie temporaire | 300°C | 500°C |
| Prairie naturelle tardive | 400°C | 800°C |
| Prairie maigre | 400°C | Déprimage peu adapté |

**Observations : le début de l'année est de nouveau très sec avec un fort déficit pluviométrique. La situation de mars s'est améliorée mais de manière hétérogène. Les températures sont douces et favorables au démarrage de la pousse de l'herbe.**

**Montagne : avec la pluie annoncée la semaine prochaine réaliser les apports d'azote sur les parcelles d'enrubannage et les parcelles destinées à la mise à l'herbe. Apport de 50-60 kgN/ha en complément des effluents d'élevage. Pour rappel il faut 10 mm de pluie dans les 15 jours pour faire fonctionner un apport d'engrais azoté.**

**Sur les autres secteurs : le stade mise à l'herbe est atteint sur prairie naturelle à 400 m d'altitude (repère de 300-350°C de cumul depuis le 1er février). Accompagner le pâturage des animaux par une complémentation en fourrage distribuée en fonction de l'herbe disponible et de la surface destinée au pâturage des animaux :**

- ***Herbe au talon (5 cm) : <150 kg MS/ha disponible***
- ***Herbe au coup de pied : env. 250 kg MS/ha***
- ***Herbe entre coup de pied et cheville : 250 à 750 kg MS/ha***




**Le RGI de nouveau à son aise pour assurer de la pousse hivernale et une mise à l'herbe précoce. Ici à 400 m d'altitude 1.2 t MS/ha disponible le 09/03, après deux passages de vaches à l'automne soit un cumul de plus de 3tms/ha d'octobre à début mars.**