

Somme de températures en °C depuis le 1^{er} février au :

03/04/23

Bas-Vivarais		Pentes (Cévennes, Coiron, Boutières)		Haut-Vivarais		Montagne	
100 m	593	400 m	528	400 m	507	900 m	335
200 m	555	500 m	490	500 m	468	1000 m	303
300 m	516	600 m	451	600 m	430	1100 m	272
400 m	478	700 m	413	700 m	394	1200 m	243
500 m	439	800 m	376	800 m	358	1300 m	216

Gestion de l'herbe : les stades repères en somme de températures

Type de prairie	Mise à l'herbe	Fin déprimage
Prairie naturelle fertile et précoce, prairie temporaire	300°C	500°C
Prairie naturelle tardive	400°C	800°C
Prairie maigre	400°C	Déprimage peu adapté

Observations : Les précipitations de mars ont été moyennes (nord 07, montagne) à faibles (sud). Le retour de températures plus froides est général. Adapter les pratiques selon les secteurs.

Montagne : la situation hydrique est favorable au démarrage des prairies, même si des gelées nocturnes sont attendues cette semaine (-3 à -4°C). La mise à l'herbe peut commencer en journée sur les prairies fertiles/prairie temporaires à 900 m voire 1000 m. Sur les pâturages attendre le repère des 400°C.

Haut-Vivarais : la situation hydrique commence à être tendue. Continuer de pâturer sur la base d'un temps de retour de 25 jours en prairie naturelle. Adapter la complémentation en fonction de l'herbe disponible.

Bas-Vivarais/Coiron/Boutières : la situation est très sèche avec très peu de pluie en mars (50% d'une année normale, <30 mm sur le mois). Vérifier l'herbe disponible au pâturage pour éviter de surpâturer (éviter de pâturer en dessous de 4 cm) :

- Herbe au talon (5 cm) : <150 kg MS/ha disponible
- Herbe au coup de pied : env. 250 kg MS/ha
- Herbe entre coup de pied et cheville : 250 à 750 kg MS/ha

Les bottes pour gérer la hauteur d'herbe

