

# Info'Prairie Ardèche – 18/04/2023

Contact: Emmanuel FOREL (emmanuel.forel@ardeche.chambagri.fr/06 85 10 09 96)



## Situation météo : Sécheresse printanière sur tous les secteurs, mais les stades de l'herbe avancent

Somme de températures en 'C depuis le 1" février au :

	-	10		100	-
7	-	м	ыл	1-3	174
		15.	-		-

Bas-Vivarais		Pentes (Cévennes, Coiron, Boutières)		Haut-Vivarais		Montagne	
100 m	754	400 m	674	400 m	640	900 m	420
200 m	707	500 m	627	500 m	593	1000 m	379
300 m	660	600 m	580	600 m	547	1100 m	339
400 m	613	700 m	533	700 m	501	1200 m	302
500 m	565	800 m	487	800 m	457	1300 m	267


Les prairies naturelles productives arrivent à épiaison sur les zones basses (repère 750°C).

Sur les zones intermédiaires (400-800 m) les graminées les plus précoces (flouve odorante) épient, mais les stades de fauches précoces ne sont pas atteints.

En altitude les prairies productives (prairies temporaires en particulier) ont démarrer à 1100 m.

La majeure partie du département est en état de forte sécheresse : les réserves en eau des sols sont à moins de 10% de remplissage. Seule la montagne, par son caractère tardif n'est pas encore touchée par ce phénomène.

Le déficit pluviométrique depuis janvier est très important : il manque 60 à 75% de pluie par rapport à une année normale de janvier à avril. La situation de Vernoux ci-contre est emblématique du département.





#### Préconisations : irriguer les premières coupes, maintenir le distribué, mise à l'herbe en montagne

Montagne : la situation hydrique est encore favorable. Il est possible d'effectuer la mise à l'herbe sur des prairies précoces fertiles qui ont démarré. Il sera possible de mobiliser les pâturages à 900 m (repère 450 °C atteint).

Haut-Vivarais/Coiron/Boutières: A 500/600 m on peut encore arroser les premières coupes d'herbe (RGI), le stade de l'herbe peut les valoriser. Au niveau des récoltes, le stade 750°C sera atteint en milieu de semaine prochaine à 400 m d'altitude. En l'absence de trop fortes températures, on peut se permettre d'attendre sans risquer de dégrader les récoltes. Au pâturage différentes solutions: soit mener large en mobilisant les landes et parcours (Cévennes/Boutières/Coiron), soit compléter la ration des animaux en distribuant du fourrage. Dans les deux cas garder un œil sur la hauteur d'herbe pour éviter les dégradations par sur-pâturage (photos ci-dessous).

Bas-Vivarais : envisager les premières coupes précoces en fonction des prévisions météo. Visiblement on ne gagnera pas beaucoup de quantité à attendre : très peu de pluie annoncée, même si le temps s'annonce perturbé. Au pâturage différentes solutions : soit mener large en mobilisant les landes et parcours, soit compléter la ration des animaux en distribuant du fourrage. Dans les deux cas garder un œil sur la hauteur d'herbe pour éviter les dégradations par sur-pâturage (photos cidessous).

#### Gestion de l'herbe : les stades repères en somme de températures

Type de prairie	Mise à l'herbe	Fin déprimage	Fauche précoce	
Prairie naturelle fertile, prairie temporaire	300°C	500°C	700°C	
Prairie naturelle tardive	400°C	700°C	900°C	
Prairie maigre	500°C	Déprim. inadapté	Inadaptée	

### Les bottes pour gérer la hauteur d'herbe





