Info'Prairie Ardèche – 26/06/2023

Contact : Emmanuel FOREL (emmanuel.forel@ardeche.chambagri.fr/06 85 10 09 96)

Situation météo : conditions estivales partout, seule la montagne garde des températures modérées

Somme de températures en °C depuis le 1er février au : 26/06/23

Bas-Vivarais		Pentes (Cévennes, Coiron, Boutières)		Haut-Vivarais		Montagne	
100 m	Fin des observations	400 m	Fin des observations	400 m	Fin des Observations	900 m	1 356
200 m	Fin des observations	500 m	Fin des observations	500 m	Fin des Observations	1000 m	1 274
300 m	Fin des observations	600 m	Fin des observations	600 m	Fin des Observations	1100 m	1 193
400 m	Fin des observations	700 m	Fin des observations	700 m	Fin des Observations	1200 m	1 114
500 m	Fin des observations	800 m	Fin des observations	800 m	Fin des Observations	1300 m	1 036

Réserve en eau des sols au : 26/06/23



Les précipitations ont été abondantes ce mois de juin sur l'ensemble du département. Associées à des températures modérées, le climat a été très favorable aux fourrages. On entre maintenant dans l'été en particulier sur les zones situées entre 100 et 600 m d'altitude avec des pluies plus rares et des températures élevées qui vont bloquer les prairies sauf les luzernes.

En zone basse, en termes de stade, tous les foins devraient être terminés : les conditions météo ont cependant gêner les chantiers.

En altitude : on est déjà au stade floraison des prairies précoces à 1100 m d'altitude, en pleine épiaison à 1300 m.

Préconisations : foin jusqu'à 1 300 m, gestion des regains et des secondes coupes ailleurs.

Montagne : la situation hydrique est très favorable. Profiter pleinement du pâturage en limitant les apports complémentaires (fourrages ou concentrés). Surveiller les prévisions météo pour engager les foins jusqu'à 1300 m d'altitude.

Haut-Vivarais/Coiron/Boutières : des repousses sont encore disponibles au pâturage grâce aux conditions météo de ces dernières semaines. Les conditions plus chaudes et plus sèches vont tarir la pousse de l'herbe. Eviter de pâturer trop ras : ne pas descendre en dessous d'une hauteur résiduelle de 5 cm.

Bas-Vivarais : Profiter de l'herbe dans les parcs ou derrière les foins. Avec l'évolution des températures à la hausse le pâturage en sous-bois est une solution pour profiter d'une herbe encore verte et mettre les animaux à l'abri des trop fortes chaleurs. Solution à adapter à chaque exploitation.

Gestion de l'herbe : les stades repères en somme de températures

Type de prairie	Mise à l'herbe	Fin déprimage	Fauche précoce	Foin (épiaison)	Foin (floraison)
Prairie naturelle fertile, prairie temporaire	300°C	500°C	700°C	1000°C	1200°C
Prairie naturelle tardive	400°C	700°C	900°C	1200°C	1400°C
Prairie maigre	500°C	Déprim. inadapté	Inadaptée	1000°C	1200°C

Les bottes pour gérer la hauteur d'herbe