


Somme de températures en °C depuis le 1^{er} février au : 28/06/20

Bas-Vivarais		Pentes (Cévennes, Coiron, Boutières)		Haut-Vivarais		Montagne	
100 m	Fin des observations	400 m	Fin des observations	400 m	Fin des Observations	900 m	Fin des observations
200 m	Fin des observations	500 m	Fin des observations	500 m	Fin des Observations	1000 m	1 383
300 m	Fin des observations	600 m	Fin des observations	600 m	Fin des Observations	1100 m	1 294
400 m	Fin des observations	700 m	Fin des observations	700 m	Fin des Observations	1200 m	1 205
500 m	Fin des observations	800 m	Fin des observations	800 m	Fin des Observations	1300 m	1 119

Réserve en eau des sols au :

28/06/20



Gestion de l'herbe : les stades repères en somme de températures

Type de prairie	Fauche précoce	Foin (épiaison)	Foin (floraison)
Prairie naturelle fertile, prairie temporaire	700°C	1000°C	1200°C
Prairie naturelle tardive	900°C	1200°C	1400°C
Prairie maigre	Inadaptée	1000°C	1200°C

Croissance d'herbe mesurée sur les pâtures au :

25/06/2020

Exploitation	Commune	Mise à l'herbe	Croissance en kg de MS/ha/jour						
			14-mai	21-mai	28-mai	4-juin	11-juin	18-juin	25-juin
GAEC de Posefoi	Peaugres (400 m)	07-mars	52	44	34	6	24	22	7
EARL de Malepertuis	Alboussière (730 m)	26-mars	30	18	21	10	26	17	17
Gaec Belledent	Coucouron (1170 m)	28-avr.	60	38	31	48	42	16	33

Observations : Malgré quelques épisodes orageux ponctuels, le beau temps et la chaleur sont installés sur l'ensemble du département. Les conditions météo deviennent très défavorables à la croissance des prairies sauf en montagne.

La situation hydrique se dégrade partout même en montagne sauf orage ponctuel.

En montagne le stade des prairies progresse : on est à floraison à 1200 m. Les graminées tardives (agrostis, fléole) présentes dans les prairies diversifiées sont en pleine épiaison.

La semaine devrait être chaude et ensoleillée, mais avec un risque orageux mercredi et jeudi : à surveiller pour la réalisation des foin.

Préconisations :

Au pâturage : avec la chaleur et l'absence de précipitations les prairies vont s'arrêter de pousser partout sauf en montagne. Pour poursuivre le pâturage on peut intégrer des surfaces de parcours ombragés et embroussaillés : à adapter selon les systèmes de production et les espèces. Une complémentation spécifique en concentrés est à prévoir. Sinon la distribution est obligatoire.

En montagne les croissances mesurées permettent de nourrir 2 UGB/ha, pour 40 UGB il faut disposer de 20 ha pour assurer la ration en fourrage. On peut intégrer des surfaces neuves : repousses derrière fauche précoce (3 semaines après la coupe) ou des reports sur pieds.

Parcelles à stocks :

En haute altitude (1300 m), c'est le stade des foins. Attention aux conditions orageuses annoncées mercredi et jeudi. Ne pas faucher trop ras (5-6 cm), pour éviter d'épuiser les plantes.

Votre avis nous intéresse : une observation, une erreur, une question, contactez-nous (06 85 10 09 96) !