

Somme de températures en °C depuis le 1^{er} février au : 19/04/20


Bas-Vivarais		Pentes (Cévennes, Coiron, Boutières)		Haut-Vivarais		Montagne	
100 m	871	400 m	805	400 m	748	900 m	537
200 m	821	500 m	755	500 m	698	1000 m	488
300 m	771	600 m	705	600 m	648	1100 m	440
400 m	722	700 m	655	700 m	598	1200 m	393
500 m	672	800 m	606	800 m	549	1300 m	348

Gestion de l'herbe : les stades repères en somme de températures

Type de prairie	Mise à l'herbe	Fin déprimage	Fauche précoce	Foin (épiaison)
Prairie naturelle fertile, prairie temporaire	300°C	500°C	700°C	1000°C
Prairie naturelle tardive	400°C	700°C	900°C	1200°C
Prairie maigre	400°C	Déprim. inadapté	Inadaptée	1000°C

Réserve en eau des sols au :

19/04/20



Croissance d'herbe mesurée sur les pâtures au :

16/04/2020

Exploitation	Commune	Mise à l'herbe	Croissance en kg de MS/ha				
			19-mars	26-mars	02-avr	09-avr	16-avr
GAEC de Posefoi	Peaugres (400 m)	07-mars	14	38	25	19	3
EARL de Malepertuis	Alboussière (730 m)	26-mars		35	26	24	36

Observations : Malgré les quelques pluies récentes, la situation hydrique n'est pas modifiée sur le département hormis quelques secteurs ponctuels (St Agrève). Météo France prévoit le maintien de ce temps toute la semaine (alternance d'éclaircies et d'averses), sans forcément de cumuls importants.



Les cumuls de températures seront élevés cette semaine : de l'ordre de 100-110°C en plaine et piémont et 80°C en montagne. Les stades de l'herbe continuent donc d'avancer même si les volumes de végétation restent faibles.

Préconisations :

Au pâturage : sur le Haut-Vivarais (valable pour toutes les zones) la croissance des pâtures est à l'arrêt : +3 kg MS/ha/j à Peaugres (voir tableau des croissances d'herbe – Mesures ADICE). La croissance relevée à Alboussière semble correspondre à une situation particulière. Aussi l'affouragement est obligatoire dans la plupart des cas, ou alors valoriser de grandes surfaces de parcours diversifiés (disposer de 100 ares/UGB).

En montagne, le stade mise à l'herbe est atteint jusqu'à 1200 m d'altitude. Souvent du fait de la sécheresse il n'y a pas ou très peu d'herbe disponible. Il est utile de sortir les animaux en particulier en système laitier pour commencer le tour de pâturage. Pour les secteurs de plus haute altitude et sur prairie maigre (1300 m), attendre encore la semaine prochaine pour effectuer la mise à l'herbe.

Parcelles à stocks :

Le stade ensilage est atteint en zone basse (jusqu'à 500 m), les ray grass peuvent être fauchés jusqu'à 600 m, tout en tenant compte des conditions météo.

Votre avis nous intéresse : une observation, une erreur, une question, contactez-nous (06 85 10 09 96) !

A Devesset chez Marc-Antoine Roche, le seigle implanté début octobre permet de faire pâturer les vaches à hauteur d'une demi ration depuis 15 jours (mise à l'herbe le 06 avril) : la diversification des assolements et des ressources est une solution pour s'adapter aux modifications du climat.

